Lue 2 fois
et corrigé

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

3188

Tumeur Carcinomateuse

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

au Mois d'Avril 1740 George Lavé garçon agé de 15
ans vint a l'hotel Dieu il avoit a la partie anterieure
et superieure du Coté droit une tumeur de la grosseur
D'un melon tres dure douloureuse inegale et fort
Rouge elle occupoit non seulement la partie anterieure
Mais Encore elle s'etendoit lateralement et posterieu
rement jusqu'a l'angle interieure de l'omoplatte
tellement qu'il ne pouvoit approcher son bras de sa
poitrine il n'y avoit que quatre mois ace qu'il nous
assuroit qu'elle avoit Commencé la Cause luy en
etoit absolument inconnu de son metier il s'occupoit
a porter la terre et il n'i avoit guere que six semaine
ou Environ qu'il avoit Cessé cet exercice y ayant ete
Contraint par rapport aux vives douleurs qu'il y
ressentoit et dont la fievre le Devoyement et l'insomnie
~~En~~ furent les suittes au Centre de la tumeur l'on —

ARC 24d 50

Sentoit un fluide et les arteres qui etoient aux—
Environs donnoient a ce fluide un mouvement —
semblable a celuy que l'on sent dans l'anevrisme
par dilatation ~~elle auroit pût la supporter avec~~
~~d'autant plus de facilité~~ l'on saigna le malade
interieurement l'on luy donna des medicaments —
humectant Rafraichisants propres a Calmer —
l'effervessence du sang Mais il etoit si Epuisse par
la violence des simptomes susdits et par les sueurs
Continuelles ou il etoit quil mourut le 4.e jour apres
son arrivé. —

L'on ouvrit son Cadavre. l'on Commença par —
le Bas Ventre dont toutes les parties se trouverent
dans leur etat naturel Ensuitte l'on passa a la —
tumeur et pour l'examiner plus Commodement
l'on fit une incision ^crucial^ aux tegements qui decouvroit
sa surface. et apres avoir Enlevé les quatres angles
l'on trouva que la tumeur s'Etendoit pardevant jusque
^avant^ sur le sternum Montant jusque sous la clavicule
et Descendant jusqu'a l'appendice xiphoide et
s'etendant posterieurement depuis l'angle interieure
de l'omoplatte jusqu'à la 3.e des fausses Cotes: +
elle etoit forme par les glandes de l'aisselle —

+ elle avoit contracte adherence avec les muscles qui recouvrent l'une, et avec le perioste qui recouvra les autres +

La membrane propre des Muscles et les
Muscles mesme dont les fibres quoique ayant
changé de substance puisquils etoient devenu
Carthilagineux avoient toujours Conservé leurs
direction toutes ces differentes parties ne faisoit
quúne Masse adherente aux Cotes et Entouré
d'un grand nombre de Vaiss.x variqueux Quand
a l'interieure de la poitrine les poulmons etoient
dans leurs etats naturels Mais dans l'une et
l'autre Coté il y avoit pres de deux pintes de serosité
Epanchée.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

n° 68.